

## Villkor för användning av **Prepper**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utveckling sstadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behand- ling	Karensid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vete, korn, råg och rågvede		Mot svamp- angrepp	Betning i slutet system		1			2 mL/kg utsäde	50 mg fludioxonil /kg utsäde		
Havre		Mot havrens bladfläck-sjuka ( <i>Pyrenophora avenae</i> ) och grodd-fusarios ( <i>Fusarium spp.</i> )	Betning i slutet system		1			2 mL/kg utsäde	50 mg fludioxonil /kg utsäde		
Ärter, kikärter, bönor, linser, lupin och sojabönor		Mot svamp- angrepp	Betning i slutet system		1			4 mL/kg frö	100 mg fludioxonil /kg frö	Betade frön av soja får endast användas för produktion av färska bönor.	

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid kalibrering och rengöring av betningsmaskin. Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	