

Villkor för användning av **Mavrik**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

| Gröda/situation | Var/ område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium /tidpunkt | Max antal behandlings- gångar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förttydliganden | Ändring |
|--|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|---|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn | | Mot insekts- angrepp | Bomspruta | BBCH 10-75 | 3 per säsong | 10 | 30 | 0,2 L/ha | 48 g tau-fluvalinat/ha | Max 1 applicering på hösten och 2 appliceringar på våren | |
| Vårvete, vårårg, vårårgvete, vårkorn och havre | | Mot insekts- angrepp | Bomspruta | BBCH 10-75 | 2 per år | 10 | 30 | 0,2 L/ha | 48 g tau-fluvalinat/ha | | |
| Lin, raps och rybs | | Mot insekts- angrepp | Bomspruta | BBCH 10-12 | 1 per år | | 60 | 0,2 L/ha | 48 g tau-fluvalinat/ha | | |
| Raps och rybs | | Mot insekts- angrepp | Bomspruta | BBCH 30-71 | 2 per år | 7 | 60 | 0,2 L/ha | 48 g tau-fluvalinat/ha | | |
| Potatis | | Mot insekts- angrepp | Bomspruta | BBCH 12-49 | 2 per år | 14 | 7 | 0,2 L/ha | 48 g tau-fluvalinat/ha | | |
| Ärtor - färska | | Mot insekts- angrepp | Bomspruta | BBCH 10-79 | 2 per år | 14 | 7 | 0,2 L/ha | 48 g tau-fluvalinat/ha | | |
| Ärtor - torkade | | Mot insekts- angrepp | Bomspruta | BBCH 10-79 | 2 per år | 14 | 14 | 0,2 L/ha | 48 g tau-fluvalinat/ha | | |
| Bönor - torkade | | Mot insekts- angrepp | Bomspruta | BBCH 50-79 | 2 per år | 14 | 14 | 0,2 L/ha | 48 g tau-fluvalinat/ha | | |
| Huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli | | Mot insekts- angrepp | Bomspruta | BBCH 10-49 | 1 per år | | 7 | 0,3 L/ha | 72 g tau-fluvalinat/ha | | |

Datum
2023-01-13Diariernr
5.1.1-B21-00423Aktnr
F-1759Produktnamn
MavrikReg nr
4491

| Gröda/situation | Var/ område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium /tidpunkt | Max antal behandlingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förttydliganden | Ändring |
|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|---|------------------------|---|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Äpple och påron | | Mot insekts- angrepp | Fläktspruta | BBCH 52-79 | 2 per år | 10 | 30 | 0,3 L/ha | 72 g tau-fluvalinat/ha | | X |
| Morot | | Mot morots- bladloppa | Bomspruta | BBCH 10-45 | 2 per år | 10 | 14 | 0,3 L/ha | 72 g tau-fluvalinat/ha | Antalet behandlingar per år med denna produkt får aldrig vara fler än två, oavsett om du följer produktens etikett och bruksanvisning eller användningsvillkor en i det utvidgade produkt- godkännandet för mindre användnings- område. | X |

Datum
2023-01-13Diariernr
5.1.1-B21-00423Aktnr
F-1759Produktnamn
MavrikReg nr
4491

| Gröda/situation | Var/område | Syfte | Behandlingsutrustning/metod | Utvecklingsstadium /tidpunkt | Max antal behandlingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring |
|------------------------------|------------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------|---|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Socker-, foder- och rödbetor | | Mot betfluga (<i>Pegomya hyoscyami</i>) och betbladlus (<i>Aphis fabae</i>) | Bomspruta | BBCH 09-39 | 2 per år | 10 | 14 | 0,2 L/ha | 48 g tau-fluvalinat/ha | Antalet behandlingar per år med denna produkt får aldrig vara fler än två, oavsett om du följer produktens etikett och bruksanvisning eller användningsvillkor en i det utvidgade produktgodkännandet för mindre användningsområde. | X |

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring |
|---|---|---|---------|
| Personlig skyddsutrustning | Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. | X |
| Vid arbete med behandlade växtdelar i fruktodling | Vid arbete med behandlade växtdelar ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas under de första 15 dyggen. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. | X |

Datum
2023-01-13Diariernr
5.1.1-B21-00423Aktnr
F-1759Produktnamn
MavrikReg nr
4491

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring |
|--|--|--|---------|
| Vid återinträde i behandlade områden | Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 60 dyggen efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. | X |
| Spridningsutrustning vid användning med fläktspruta | Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 99 % användas. I andra fall ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas. | Villkoret är till för att skydda människors hälsa, insekter utanför fältet och vattenlevande organismer. | X |
| Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". | Villkoret är till för att skydda människor i närområdet, insekter utanför fältet och vattenlevande organismer. | X |
| Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta. | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan. | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet. | X |
| Spridningsutrustning vid användning med bomspruta i odlingar av betor | Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer. | X |
| Spridningsutrustning vid användning med bomspruta i odlingar av morötter | Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer. | X |