

Villkor för användning av Mustang Forte

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårkorn, vårvede, vårhavre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13–20	1 per år			300 mL/ha	3 g aminopyralid/ha 1,5 g florasulam/ha 54 g 2,4-D/ha	Endast en applicering per gröda och odlingssäsong.	
Vårkorn, vårvede, vårhavre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 21–32	1 per år			750 mL/ha	7,5 g aminopyralid/ha 3,75 g florasulam/ha 135 g 2,4-D/ha	Endast en applicering per gröda och odlingssäsong.	
Höstvede, höstråg, höstrågvete och höstkorn		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 21–32 Endast vår- behandling	1 per år			1 L/ha	10 g aminopyralid/ha 5 g florasulam/ha 180 g 2,4-D/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom".	Villkoren är till för att skydda växter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Skydd av efterföljande gröda	Stråsäd, raps, rybs, gräs och majs kan etableras den påföljande växtsäsongen. Mustang Forte innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande känsliga grödor inom följande perioder efter behandling med Mustang Forte: - 14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter. - 24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.		
Hantering av halm och gödsel	Behandlad halm bör inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter. Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) innehållande behandlad halm bör inarbetas (nedplöjas) i jorden minst sju månader före etablering av ovan angivna känsliga grödor. Inget särskilt tidsintervall för inarbetning i jorden behövs före sådd av stråsäd, raps, rybs, gräs och majs. Halm från en behandlad gröda kan användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halmen och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller sådan halm får dock endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk.		