

Villkor för användning av Caryx

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstraps		För tillväxtreglering Mot <i>Leptosphaeria maculens</i>	Bomspruta	BBCH 13–59	2 per år			1,4 L/ha	224 g mepikvat/ha 42 g metkonazol/ha	Den totala maximala dosen får inte överstiga 1,4 L/ha och år. Om 2 behandlingar ska göras ska den ena behandlingen göras på hösten och den andra på våren.	
Vårraps		För tillväxtreglering Mot <i>Leptosphaeria maculens</i>	Bomspruta	BBCH 31–55	1 per år			1,4 L/ha	224 g mepikvat/ha 42 g metkonazol/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Påfyllningsutrustning	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att förhindra stänk som kan orsaka ögonskador.	X