

Bilaga 2

Bruksanvisning för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för:

Mateno Duo SG, reg.nr 5688

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ansöker om UPMA för att få använda herbiciden Mateno Duo, reg.nr 5688 för att bekämpa gräsogräset råttsvingel i fröodlingar av rödsvingel, fårsvingel, hårdsvingel och ängsgröe.

Denna bruksanvisning som gäller för UPMA ska läsas tillsammans med produktens ordinarie etikett och bruksanvisning. Där finns viktig information som också gäller vid användning enligt ett UPMA.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

När en produkt används enligt ett UPMA ansvarar användaren själv för produktens effektivitet och för fytotoxiska skador som kan uppstå på grödan.

Användningsområde:

Mateno Duo ämnas att användas i etablerad frövall på hösten från BBCH 10-23 i rödsvingel, fårsvingel, hårdsvingel och ängsgröe för bekämpning av gräsogräset råttsvingel.
--

Anvisningar om användning:

Tidpunkt för applicering av Mateno Duo i frövall

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare yrkar på dosering 0,35 l./ha i ovan nämnda arter för fröproduktion med ett syfte att bekämpa råttsvingel på hösten inom behandlingsintervallet 1-bladstadiet t.o.m. huvudskott samt 3 sidoskott, BBCH 10-23 . Enbart 1 behandling/år.

För god effekt på råttsvingel är viktigt att inte bryta den markfilm som bildas vid behandling med Mateno Duo, därför bör vältning efter behandling undvikas. Likaså bör putsning undvikas innan bekämpning. Växtrest från föregående skörd skall bör bortföras innan bekämpning.

Mateno Duo är effektivt även vid låga temperaturer. Lätt nederbörd efter behandling ökar normalt sett effekten. Mateno Duo kan i samband med behandling och en tid därefter ge en övergående ljusfärgning av grödan. Symptomen är normalt övergående och under normala förhållanden påverkas inte

skörden negativt. Risken för ljusfärgning ökar om: det omedelbart efter behandling kommer kraftig nederbörd samt vid nattfrost.

Appliceringsteknik

Rekommenderad vätskemängd 150-200 liter/ha. För val av specifik appliceringsteknik hänvisas brukaren till etiketten för Matendo Duo samt ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom.” Skyddsavstånden ska alltid avläsas i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan

Gröda	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Karens tid (dygn)	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliga anden
						Produkt	Verksam ämne	
Rödsvin gel, färsvingel, hårdsvin gel och ängsgrö e	Bekämpning av rättsvingel i gräsfrövall för fröproduktion.	Bomspruta	BBCH 10-23 Höstanvändning	1	Ej relevant	0,35 l./ha	Aklonifen 175 g/ha, Diflufenikan 35 g/ha	150 – 200 liter vätskemängd /ha

För närmare information gällande verkningsätt, resistensrisk, optimala verkningsförhållanden, blandningar, beredning av sprutvätska, rengöring av sprututrustning, hantering av tomemballager samt förvaring av medel hänvisas till produktens etikett och bruksanvisning.

**För informationen i denna bilaga ansvarar
Sveriges Frö- & Oljeväxtodlare**