

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Goltix Gold

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Kepalök	Fält	Mot örtogräs	Bomspruta	Efter sådd, före uppkomst Mars-maj	1 gång vart tredje år			1,5 L/ha	1050 g metamitron/ha	Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metamitron och dess metabolit riskerar att läcka till grundvattnet.	
Morötter, rotpersilja, palsternacka	Fält	Mot örtogräs	Bomspruta	Efter sådd, före uppkomst Mars-juni	1 gång vart tredje år			1,5 L/ha	1050 g metamitron/ha	Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metamitron och dess metabolit riskerar att läcka till grundvattnet.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda människor i närområdet och växter utanför fältet.	