

Bruksanvisning för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för:

Boxer, reg.nr 5760

Denna bruksanvisning som gäller för UPMA ska läsas tillsammans med produktens ordinarie etikett och bruksanvisning. Där finns viktig information som också gäller vid användning enligt ett UPMA.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

När en produkt används enligt ett UPMA ansvarar användaren själv för produktens effektivitet och för fytotoxiska skador som kan uppstå på grödan.

Användningsområde och anvisningar om användning

Användning för bekämpning av ogräs i:

- Jordgubbar på friland
- Morot, palsternacka, rotpersilja, rotselleri, bruna bönor och sparris på friland
- Kepsalök, knipsalök (av kepsalök och sallatsalök), purjölök och vitlök på friland

Notera att särskilda ytterligare villkor gäller för användning av produkten.

Detta för att förhindra resthalter i gröda där rester av prosulfokarb inte får förekomma.

- Användning för bekämpning av ogräs i yrkesmässig odling av **jordgubbar** på friland.
- Max **2 behandlingar** per år, minst **14 dagar mellan behandlingarna**
- Maximal mängd preparat vid varje behandling **2,5 liter per hektar**
- Maximal total mängd preparat per år **5 liter per hektar**
- Behandlingstidpunkt:
- **Etablerade jordgubbar:** Efter skörd. **Tidigast från 1 september.**
- **Nyplanterade jordgubbar:** Tidigast 2 veckor efter plantering, **före 31 maj eller från 1 september** fram till mitten av oktober
- **Karenstid:** Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion vid användning i nyplanterade jordgubbar. I etablerade jordgubbar får användning ske endast efter skörd, tidigast från 1 september. Konsumtion kan således inte ske förrän året därpå.
- **Vattenmängd 200–300 liter per hektar**

- Användning för bekämpning av ogräs i yrkesmässig odling av **morot, palsternacka, rotpersilja och rotselleri** på friland.
- Max **2 behandlingar** per år **före 31 maj**, minst **5 dagar mellan behandlingarna**
- Maximal mängd preparat vid varje behandling **2 liter per hektar**
- Maximal total mängd preparat per år **4 liter per hektar**
- Behandlingstidpunkt: **BBCH 11–14**, när grödan har 1 till 4 örtblad.
- **Karenstid: 80 dagar**
- **Vattenmängd 200–300 liter per hektar**

- Användning för bekämpning av ogräs i yrkesmässig odling av **sparris** på friland.
- Max **1 behandling** per år.
- Maximal mängd preparat vid denna behandling **3,2 liter per hektar**
- Behandlingstidpunkt: **Efter skörd. Före 31 maj eller från 1 september**
- **Karenstid:** Inte aktuellt eftersom behandling bara får ske efter skörd.
- **Vattenmängd 200–300 liter per hektar**

- Användning för bekämpning av ogräs i yrkesmässig odling av **bruna bönor** på friland.
- Max **1 behandling** per år.
- Maximal mängd preparat vid denna behandling **3 liter per hektar**
- Behandlingstidpunkt: **Före uppkomst. Före 31 maj.**
- **Karenstid:** Inte aktuellt eftersom behandling bara får ske före grödans uppkomst.
- **Vattenmängd 200–300 liter per hektar**

- Användning för bekämpning av ogräs i yrkesmässig odling av **kepalök och knipplök (av kepalök och sallatslök)** på friland.
- Max **4 behandlingar** per år, minst **5 dagar mellan behandlingarna.**
- Maximal mängd preparat vid varje behandling **2 liter per hektar**
- Maximal total mängd preparat per år **4 liter per hektar**
- Behandlingstidpunkt: **BBCH 00 (före uppkomst) till och med BBCH 14 (när löken har 4 blad). Behandling före 31 maj.**
- **Karenstid: 60 dagar**
- **Vattenmängd 200–300 liter per hektar**

- Användning för bekämpning av ogräs i yrkesmässig odling av **purjolök** på friland.
- Max **4 behandlingar** per år, minst **5 dagar mellan behandlingarna**
- Maximal mängd preparat vid varje behandling **2 liter per hektar**
- Maximal total mängd preparat per år **4 liter per hektar**
- Behandlingstidpunkt: **BBCH 00 (före uppkomst eller plantering) till och med BBCH 14 (när löken har 4 blad). Behandling före 31 maj.**
- **Karenstid: 80 dagar**
- **Vattenmängd 200–300 liter per hektar**

- Användning för bekämpning av ogräs i yrkesmässig odling av **vitlök** på friland.
- Max **4 behandlingar** per år, minst **5 dagar mellan behandlingarna**
- Maximal mängd preparat vid varje behandling **2 liter per hektar**
- Maximal total mängd preparat per år **4 liter per hektar**
- Behandlingstidpunkt: **BBCH 00 (före uppkomst) till och med BBCH 14 (när löken har 4 blad). Behandling före 31 maj eller från 1 september.**
- **Karenstid: 70 dagar**
- Vattenmängd **200–300 liter per hektar**

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment med risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.

Vid spridning på våren, fram till 31 maj:

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.

Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Villkoret är till för att skydda användare och vattenlevande organismer.

Vid spridning på hösten, från 1 september:

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.

Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.

Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.

Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas.

Körhastigheten får vara max 8 km/h.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Villkoret är till för att skydda användare, kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och vattenlevande organismer.

För närmare information gällande verknings sätt, resistensrisk, optimala verkningsförhållanden, blandningar, beredning av sprutvätska, rengöring av sprututrustning, hantering av tomemballag samt förvaring av medel hänvisas till produktens etikett och bruksanvisning.

För informationen i denna bilaga ansvarar LRF