

Villkor för användning av Protendo 300 EC

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydlig anden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vete, korn, råg, rågvete och havre		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 30–69	2 per säsong	14	35	0,65 L/ha	195 g protiokonazol/ha		
Raps och rybs		Mot bomullsmögel (<i>Sclerotinia sp.</i>) och svartfläcksjuka (<i>Alternaria sp.</i>)	Bomspruta	BBCH 61–69	1 per säsong		56	0,6 L/ha	180 g protiokonazol/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och människor i närområdet.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	