

Villkor för användning av RATIO Super SX

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårveete, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 11–39	1 per år			30 g/ha	7,5 g tribenuronmetyl/ha 7,5 g tifensulfuronmetyl/ha	Användning får även ske i stråsäd med insädd av vall.	
Höstveete, höstkorn, höstråg och rågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–39 Endast vårbehandling	1 per år			30 g/ha	7,5 g tribenuronmetyl/ha 7,5 g tifensulfuronmetyl/ha	Användning får även ske i stråsäd med insädd av vall.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	