

Villkor för användning av Fenix

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X. Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Böror/torkade		Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g aklonifen/ha		
Kummin		Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g aklonifen/ha	Endast under insåningsåret.	
Morot		Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g aklonifen/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Morot		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0–14	2 per år	12		450 mL/ha	270 g aklonifen/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Morot		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0–14	3 per år	7		300 mL/ha	190 g aklonifen/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Dill till fröproduktion		Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g aklonifen/ha		
Kepalök		Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g aklonifen/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings-	X

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
										strategier får inte kombineras.	
Kepalök		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0–14	2 per år	12		450 mL/ha	270 g aklonifen/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
Kepalök		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0–14	3 per år	7		300 mL/ha	190 g aklonifen/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
Palsternacka		Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g aklonifen/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
Palsternacka		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0–14	2 per år	12		450 mL/ha	270 g aklonifen/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
Palsternacka		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0–14	3 per år	7		300 mL/ha	190 g aklonifen/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
Ärter		Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g aklonifen/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika	X

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
										behandlings- strategier får inte kombineras.	
Ärter		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 11–30	1 per år			350 mL/ha	210 g aklonifen/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
Potatis		Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			1,75 L/ha	1,05 kg aklonifen/ha		
Jordärts- kocka		Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g aklonifen/ha		
Träd i plantskolor inklusive skogs- plantskolor		Mot ogräs	Sprutning		1 per år			450 mL/ha	270 g aklonifen/ha	Behandling då växten är i vila.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	
Spridningsutrustning vid användning i potatis	Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	