

## Villkor för användning av Forapro

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vete och korn		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 30-65	1 gång vart tredje år			0,8 L/ha	140 g protiokonazol/ha 200 fenpropidin/ha		
Rågvete		Mot gulrost ( <i>Puccinia striiformis</i> ) och mjöldagg ( <i>Blumeria graminis</i> )	Bomspruta	BBCH 30-65	1 gång vart tredje år			0,8 L/ha	140 g protiokonazol/ha 200 fenpropidin/ha		
Råg		Mot mjöldagg ( <i>Blumeria graminis</i> ) och sköldfläcksjuka ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	Bomspruta	BBCH 30-65	1 gång vart tredje år			0,8 L/ha	140 g protiokonazol/ha 200 fenpropidin/ha		
Havre		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 30-65	1 gång vart tredje år			0,6 L/ha	105 g protiokonazol/ha 150 fenpropidin/ha		

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, ögonskydd, ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Påfyllningsutrustning vid användning av bomspruta	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att förhindra stänk som kan orsaka ögonskador.	
Vid återinträde i behandlade områden	Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden/arbete med behandlade växtdelar. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid spridning	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.	Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.	
Spridningsutrustning vid användning	Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd".	Villkoret är till för att skydda människor i närområdet och vattenlevande organismer.	