

Villkor för användning av DFF SC 500

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 10–15	1 per år			0,1 L/ha	50 g diflufenikan/ha	Varje användning representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras	X
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–28 Endast vår- behandling	1 per år			0,12 L/ha	60 g diflufenikan/ha	Varje användning representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras	X
Vårvete, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 11–28 Endast vår- behandling	1 per år			0,1 L/ha	50 g diflufenikan/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpredda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Tillredning av brukslösning	Produkten ska skakas före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av brukslösning.	