

Villkor för användning av Gullviks Grande

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

| Gröda/ situation | Var/ område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium/ tidpunkt | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete | | Mot örtogräs | Bomspruta | BBCH 20–29 Endast vår- behandling | 1 per år | | | 75 mL/ha | 37,5 g diflufenikan/ha 3,75 g florasulam/ha | Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras. | |
| Höstvete, höstkorn, höstråg, höstrågvete | | Mot örtogräs | Bomspruta | BBCH 30–32 Endast vår- behandling | 1 per år | | | 100 mL/ha | 50 g diflufenikan/ha 5,0 g florasulam/ha | Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras. | |
| Vårvete, vårkorn och havre | | Mot örtogräs | Bomspruta | BBCH 12–29 | 1 per år | | | 75 mL/ha | 37,5 g diflufenikan/ha 3,75 g florasulam/ha | Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras. | |
| Vårvete, vårkorn och havre | | Mot örtogräs | Bomspruta | BBCH 30–32 | 1 per år | | | 100 mL/ha | 50 g diflufenikan/ha 5,0 g florasulam/ha | Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras. | |
| Utsädes- produktion av gräs | | Mot örtogräs | Bomspruta | BBCH 20–29 Endast vår- behandling | 1 per år | | | 75 mL/ha | 37,5 g diflufenikan/ha | Endast i etablerad odling. | |

| Gröda/ situation | Var/ område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium/ tidpunkt | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| | | | | | | | | | 3,75 g florasulam/ha | Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras. | |
| Utsädes- produktion av gräs | | Mot örtgräs | Bomspruta | BBCH 30–32 Endast vår- behandling | 1 per år | | | 100 mL/ha | 50 g diflufenikan/ha 5,0 g florasulam/ha | Endast i etablerad odling. Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras. | |

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring |
|--|---|--|---------|
| Anpassade skydds- avstånd vid spridning | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert Växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet. | |