

Bilaga 1

Bruksanvisning för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för:

Corum reg.nr 5631 mot örtogräs i fröodlingar av klöverfrö.

Denna bruksanvisning som gäller för UPMA ska läsas tillsammans med produktens ordinarie etikett och bruksanvisning. Där finns viktig information som också gäller vid användning enligt ett UPMA.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

När en produkt används enligt ett UPMA ansvarar användaren själv för produktens effektivitet och för fytotoxiska skador som kan uppstå på grödan.

Användningsområde:

Corum ämnas att användas på våren i fröodling av klöverfrö. Mot örtogräs under April och maj t.om. klöverns begynnande stråskjutning (BBCH 23-32), som infaller när klövern är ca 30cm hög.

Anvisningar om användning:

Behandlingen kan göras som en behandling med max 1,25 L/ha eller som en delad behandling med till exempel 0,6 L/ha två gånger. Vid en behandling rekommenderas behandling på små ogräs. Vid delad behandling skall ett minsta sprutintervall mellan behandlingarna vara 7 dagar. Corum är primärt kontaktverkande och bör användas på uppkommet ogräs som är i tillväxt. Bäst effekt uppnås vid morgonsprutning. Corum ska alltid användas tillsammans med Dash för att säkerställa effekten. Doseringen av DASH är som utgångspunkt 1:1 med Corum, men under förhållanden med tunt vaxlager på grödan, bör mängden DASH reduceras till 0,5 L/ha eller lägre. Tunt vaxlager uppstår ofta under varma och fuktiga växtförhållanden, medan kyliga och torra förhållanden ger kraftigt vaxlager och därmed krav på högre mängd DASH (1:1). Är det samtidigt mycket våta jordförhållanden är rekommendationen delad behandling, beroende på att rotupptaget kan vara för högt och resultera i en stressad gröda p.g.a. för hög preparatkoncentration i plantan. Under våta jordförhållanden bör DASH-mängden reduceras till 0,5 L/ha eller lägre. Undvik sprutning efter klöverns sträckningsfas. Undvik att behandla vid höga temperaturer (> 20 C) och i intensivt solljus. Grödan kan påverkas av Corum med symptom som kan vara ljus gulfärgning, bladrollning eller tillväxthämning. Normalt sett försvinner symptomen under odlings säsongen. Håll avstånd till intilliggande grödor för att undvika skador på dessa.

För val av specifik appliceringsteknik hänvisas brukaren till etiketten Corum samt ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom.” Skyddsavstånden ska alltid avläsas i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan

För närmare, ytterligare information gällande verkningsätt, resistensrisk, optimala verkningsförhållanden, blandningar, beredning av sprutvätska, rengöring av sprututrustning, hantering av tomemballage samt förvaring av medel hänvisas till produktens etikett och bruksanvisning.

För informationen i denna bilaga ansvarar Sveriges Frö- & Oljeväxtodlare.