

## Villkor för användning av Polyversum

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Raps		Mot bomullsmögel ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) och torröta ( <i>Leptosphaeria maculans</i> )	Bomspruta	BBCH 12–65	3 per år	14		100 g/ha	10 <sup>8</sup> oosporer/ha		
Vete		Mot axfusarios ( <i>Fusarium</i> spp.)	Bomspruta	BBCH 13–65	3 per år	14		100 g/ha	10 <sup>8</sup> oosporer/ha		
Vårkorn		Mot axfusarios ( <i>Fusarium</i> spp.)	Bomspruta	BBCH 21–65	2 per år	14		100 g/ha	10 <sup>8</sup> oosporer/ha		

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning vid spridning	Skyddskläder, skyddshandskar och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddskläder och skyddshandskar skall användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Hantering av brukslösning	Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.	Villkoret krävs för att brukslösningen ska vara homogen under tillredning och spridning.	
Hantering av brukslösning	Vid spridning av brukslösningen ska filter med 50 mesh (masktäthet) användas i spridningsutrustningen.	Villkoret krävs för att utrustningen inte ska täppas igen under spridning.	X