

Bruksanvisning för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för:

Mospilan SG, reg.nr 5948

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare beviljades den 8 mars 2024 UPMA-godkännande för att få använda insekticiden Mospilan SG, reg nr 5958, för att bekämpa klöverspetsvivelns vuxna individ och dess larv i fröodlingar av klöver (rödklöver, alsikeklöver samt vitklöver).

Denna bruksanvisning som gäller för UPMA ska läsas tillsammans med produktens ordinarie etikett och bruksanvisning. Där finns viktig information som också gäller vid användning enligt ett UPMA.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

När en produkt används enligt ett UPMA ansvarar användaren själv för produktens effektivitet och för fytotoxiska skador som kan uppstå på grödan.

Användningsområde:

Mospilan SG ämnas att användas från sent knoppstadie till begynnande blomning, BBCH 55 - 63. Preparatet klassas som inte vara bifarligt. Trots detta förordar vi en behandling på kvällen när pollinatörerna lämnat fältet. Mospilan SG verkar systemiskt vilket borgar för en god effekt på hela plantan samtidigt som ett visst långtidsskydd erhålles vilket ur odlarsynpunkt får betraktas som kritiskt. Vid behov finns det möjlighet att använda Mavrik vid en eventuell senare behandling. Att enbart använda Mavrik anses som ett betydligt sämre alternativ eftersom Mavrik saknar systemisk effekt.

Anvisningar om användning:

Tidpunkt för applicering av Mospilan SG
--

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare yrkar på dosering i klöver till fröproduktion med ett syfte att bekämpa klöverspetsvivel i en dosering av 200 gram per hektar inom behandlingsintervallet: sent knoppstadie till begynnande blomning BBCH 55 – 63. Enbart 1 behandling per vartannat år, på det enskilda skiftet. Rekommenderad vätskemängd 200–600 liter per ha.

För val av specifik appliceringsteknik hänvisas brukaren till etiketten för Mospilan SG samt ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd.” Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom.” Skyddsavstånden ska alltid avläsas i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.

Totala dosen av verksamt ämne på ett fält. För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande acetamiprid under det
--

efterföljande året på samma fält när produkten har använts i odlingar av klöver för utsädesproduktion.

Villkoret är till för att skydda grundvattnet och motsvarar SPe 1.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar, skyddskläder samt ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid arbete med behandlade växtdelar: Personer som arbetar med behandlade växtdelar ska informeras om produktens hälsorisker.

Gröda	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Karens tid (dygn)	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden
						Produkt	Verksamt ämne	
Röd-klöver, alsike-klöver och vit-klöver	Bekämpning av klöverspetsvivel - dess vuxna individ samt dess larv	Bom-spruta	Sent knoppstadie till begynnande blomning BBCH 55 - 63	1	Ej relevant	0,2 kg/ha	40 g acetamid/ha	200–600 liter vätskemängd /ha

För närmare information gällande verknings sätt, resistensrisk, optimala verkningsförhållanden, blandningar, beredning av sprutvätska, rengöring av sprututrustning, hantering av tomemballage samt förvaring av medel hänvisas till produktens etikett och bruksanvisning.

För informationen i denna bilaga ansvarar Sveriges Frö- & Oljeväxtodlare