

## Villkor för användning av Teppeki Ultra SG 50%

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Kärnfrukt		Mot bladlöss	Fläktspruta	BBCH 51-75 Maj-juli	3 gånger per år	21	21	70 g/m kronhöjd	35 g flonikamid/ m kronhöjd	Den maximala dosen får inte överskrida 140 g produkt/ha	
Korn och havre		Mot bladlöss	Sprutning	BBCH 21-77 April-juni	1 gång per år			140 g/ha	70 g flonikamid/ ha		
Vete, råg, rågvete, speltvete		Mot bladlöss	Sprutning	BBCH 21-77 April-juni	2 gånger per år	21	28	140 g/ha	70 g flonikamid/ ha		
Ärter, torkade bönor och färska bönor med balja	Fält	Mot bladlöss	Sprutning	BBCH 11-71 April-juli	1 gång per år		14	140 g/ha	70 g flonikamid/ ha		

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid återinträde i behandlade områden vid användning i kärnfrukt	Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlat område under de första 7 dagarna efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 70 dagar vid återinträde i behandlat område.  Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda de som arbetar i behandlade områden.	
Vid spridning	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.	Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.	