

## Villkor för användning av Turex 50 WP

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Äpple, päron, plommon, körsbär		Mot fjärils- larver	Sprutning	BBCH 53-99	3 per år	7		2 kg/ha	1,7·10 <sup>13</sup> CFU/ha		
Köksväxter: Tomat, paprika, chili- peppar, aubergine, slanggurka, druvgurka, squash, melon och patisson	Växt- hus	Mot fjärils- larver	Sprutning		6 per år	7		1 kg/ha	8,5·10 <sup>12</sup> CFU/ha		
Köksväxter: Salladskål, pakchoi/ asiatisk bladkål (choikål), blomkål, broccoli, sarepta- senap, kålrabbi	Växt- hus	Mot fjärils- larver	Sprutning		3 per år	7		1 kg/ha	8,5·10 <sup>12</sup> CFU/ha		

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Kålväxter; Rödkål, savojkål, vitkål, spetskål, brysselkål, grönkål, salladskål, pakchoi/ asiatisk bladkål (choikål), blomkål, broccoli, sarepta- senap och kålrabbi	Fält	Mot fjärils- larver	Sprutning		3 per år	7		1 kg/ha	8,5·10 <sup>12</sup> CFU/ha		
Prydnads- växter; Perenner, blommor och plantskole- växter	Fält	Mot fjärils- larver	Sprutning		6 per år	7		1 kg/ha	8,5·10 <sup>12</sup> CFU/ha		
Prydnads- växter; Perenner, blommor och plantskole- växter	Växt- hus	Mot fjärils- larver	Sprutning		6 per år	7		1 kg/ha	8,5·10 <sup>12</sup> CFU/ha		
Vinbär (röda-, vita och svarta vinbär)		Mot fjärils- larver	Sprutning	BBCH 00-79	3 per år	7		1 kg/ha	8,5·10 <sup>12</sup> CFU/ha		

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Jordgubbar	Fält Växt- hus	Mot fjärils- larver	Sprutning	BBCH 13-93	3 per år	7		1 kg/ha	8,5·10 <sup>12</sup> CFU/ha		
Sallat	Fält Växt- hus	Mot fjärils- larver	Sprutning	BBCH 09-99	3 per år	7		1 kg/ha	8,5·10 <sup>12</sup> CFU/ha		
Frö- produktion av gran och tall		Mot fjärils- larver	Sprutning	BBCH 09-99	3 per år	7		2 kg/ha	1,7·10 <sup>13</sup> CFU/ha		

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, ansiktsskydd samt andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär kontakt med brukslösning eller sprutdimma.  Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.		X