

Villkor för användning av Cliophar 600 SL

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydlig- anden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Sockerbetor, foderbetor och rödbetor		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 12-15	1 per år			200 mL/ha	120 g klopyralid/ha		
Rödkål, vitkål, spetskål och savoykål		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 12-15	1 per år			200 mL/ha	120 g klopyralid/ha		
Vete, korn, råg, rågvete och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 21-32 Endast vår- behandling	1 per år			200 mL/ha	120 g klopyralid/ha	Behandling får göras tidigast från 1 april.	
Majs		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13-16	1 per år			200 mL/ha	120 g klopyralid/ha	Gäller ej sockermajs.	
Lin		Mot örtogräs	Bomspruta	Turner (1987) 3-5	1 per år			200 mL/ha	120 g klopyralid/ha		
Skogsplant- skolor och skogs- planteringar	Åkermark	Mot örtogräs	Handhållen spruta	Endast vår- behandling	1 per år			200 mL/ha	120 g klopyralid/ha		
Slåttervall och betesvall, gräsfrö till utsäde		Mot örtogräs	Bomspruta	Endast vår- behandling	1 per år		7	200 mL/ha	120 g klopyralid/ha	Betesdjur får släppas på behandlad betesmark 7 dagar efter behandling.	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydlig- anden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårrops och vårrys		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 12-55	1 per år			200 mL/ha	120 g klopuralid/ha		
Höstraps och höstrybs		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 31-55 Endast vår- behandling	1 per år			200 mL/ha	120 g klopuralid/ha	Behandling får göras tidigast från 1 april.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X