

Villkor för användning av Tachigaren 70 WP

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Sockerbetor		Mot svamp- angrepp	Betning av utsäde i slutet betnings- anläggning		1			40 g/enhet frö	28 g hymexazol/ enhet frö	1 enhet frö = 100 000 frön. Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Sockerbetor		Mot svamp- angrepp	Betning av utsäde		1			20 g/enhet frö	14 g hymexazol/ enhet frö	1 enhet frö = 100 000 frön. Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, ögonskydd, andningsskydd och skyddskläder ska användas vid tillblandning och påfyllning av brukslösning, vid kalibrering och rengöring av betningsmaskin samt vid betning i anläggningar som inte är slutna. Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Åtgärder för skydd av miljö vid hantering av betat utsäde	Spill av betat utsäde ska omedelbart samlas upp.	Betat utsäde är giftigt för fåglar och däggdjur.	