

Villkor för användning av Flurostar Forte

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 20-39 Endast vårbehandling	1 per år			300 mL/ha	120 g fluroxipyr/ha		
Kärnmajs och fodermajs		Mot snärjmåra (<i>Galium aparine</i>) och nattskatta (<i>Solanum nigrum</i>)	Bomspruta	BBCH 13-16	1 per år			150 mL/ha	60 g fluroxipyr/ha		
Nyetablerade odlingar av gräsvall och gräsfrövall för utsäde		Mot snärjmåra (<i>Galium aparine</i>) och våtarv (<i>Stellaria media</i>)	Bomspruta	Från BBCH 20 Mars-juli	1 per år		7	300 mL/ha	120 g fluroxipyr/ha		
Etablerade odlingar av gräsvall och gräsfrövall för utsäde		Mot tusensköna (<i>Bellis perennis</i>) och maskros (<i>Taraxacum sp.</i>)	Bomspruta	Mars-juli	1 per år		7	750 mL/ha	300 g fluroxipyr/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom "	Villkoret är till för att skydda växter utanför fält och akvatiska organismer	
Personlig skyddsutrustning	Ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Andra hälsoskydds åtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Påfyllningsutrustning	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att förhindra stänk som kan orsaka ögonskador.	
Vid omsådd	Efter behandling med produkten bör omsådd inte ske med majs eller ärter. Omsådden med övriga grödor bör endast ske efter plöjning eller annan djupbearbetning.	Produkten innehåller fluroxipyr som kan skada efterföljande grödor.	
Skydd för efterföljande grödor	Rotgrönsaker och knölgrönsaker får odlas tidigast ett år efter behandling med produkten.	Produkten innehåller fluroxipyr som kan leda till överskridande av gränsvärden för resthalter i efterföljande grödor.	