

Villkor för användning av Karate 5 CS - Dispens under perioden 2024-05-23 till 2024-09-08

Användning och syfte

| Gröda/ situation | Var/ område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium/ tidpunkt | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förtydliganden |
|--|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | |
| Späda blad- grönsaker (baby-leaf) | Fält | Mot jord- loppor | Bomspruta | BBCH 09-18 | 2 under dispens- perioden | 12 | 7 | 150 mL/ha | 7,5 g lambda- cyhalotrin/ha | Dispensen får bara användas om Raptol redan använts 2 gångar på fältet under säsongen. |
| Purjolök | Fält | Mot trips | Bomspruta | BBCH 12-47 | 2 under dispens- perioden | 14 | 7 | 150 mL/ha | 7,5 g lambda- cyhalotrin/ha | |

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning |
|------------------------------------|--|--|
| Personlig skyddsutrustning | Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. |
| Arbete med behandlade växtdelar | Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 11 dagarna efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 6 dagar vid återinträde i behandlade områden. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. |
| Vid spridning | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Vid spridning ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas. Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. | Villkoret är till för att skydda människors hälsa, vattenlevande organismer och bin och andra insekter utanför fältet. |