

## Villkor för användning av Betasana 160 SE

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Sockerbetor, foderbetor och rödbetor	Fält	Mot ört-ogräs	Bomspruta	Efter uppkomst upp till BBCH 18	4 per år	6	90	6,0 L/ha	960 g fenmedifam/ha	Den totala maximala dosen får inte överskrida 6,0 liter produkt per hektar och år.	

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Ögonskydd och skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid återinträde i behandlade områden	Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under 67 dagar efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Anpassade skyddsavstånd	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Tillredning av brukslösning	Vid tillredning av brukslösning ska ett växtskyddsmedel som innehåller metomitron och/eller etofumesat tillsättas.	Villkoret är till för att säkerställa en effektiv behandling.	
Vid spridning	Produkten får inte användas när lufttemperaturen understiger 20°C.	Villkoret är till för att säkerställa en effektiv behandling.	