

Villkor för användning av Exirel - Dispens under perioden 2024-06-14 till 2024-10-12

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden
								Produkt	Verksamt ämne	
Raps, Rybs		Mot kålmal	Bomspruta	BBCH 10-19	1 gång under dispensperioden			0,4 L/ha	40 g cyantraniliprol/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras
Vårrops, vårrybs		Mot kålmal	Bomspruta	BBCH 30-59	1 gång under dispensperioden			1 L/ha	100 g cyantraniliprol/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.
Vid återinträde i behandlade områden	Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.
Vid spridning	För att skydda bin och andra pollinerande insekter får växtskyddsmedlet inte spridas där det i genomsnitt finns fler än fem växter per kvadratmeter som har utslagna blommor.	Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."	Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.