

SV

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT

Jade Pasta

Produkttyp(er)

PT14: Rodenticider

Godkännandenummer: 5451

R4BP-tillgångsnummer: SE-0000977-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	JADE PASTA
-------------	------------

1.2. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	LODI S.A.S.
	Adress	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Frankrike
Godkännandenummer		5451
<i>R4BP-tillgångsnummer</i>		SE-0000977-0000
Datum för godkännande		31/05/2018
Utgångsdatum för godkännande		01/07/2026

1.3. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	LODI SAS
Tillverkarens adress	Parc d'activités des 4 routes 35390 Grand Fougeray Frankrike
Tillverkningsställets belägenhet	LODI SAS site 1 Parc d'activités des 4 routes 35390 Grand Fougeray Frankrike LODI SAS site 2 Parc d'activités du Pays du Grand Fougeray Espace Nord 24 et 26 rue des Pionniers 35390 GRAND FOUGERAY Frankrike

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	Bromadiolon
Tillverkarens namn	Pelgar
Tillverkarens adress	Unit 13, Newman Lane, Industrial Estate GU34 2QR ALTON HANTS Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Tillverkningsställets belägenhet	Pelgar site 1 Prazska 280 02 Kolin Tjeckien

Kapitel 2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	verksamt ämne	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Typ(er) av formuleringar

RB Bruksfärdigt bete

Kapitel 3. FARO- OCH SKYDDSSANGIVELSER

Faroangivelser	<p>H360D: Kan skada det ofödda barnet.</p> <p>H372: Orsakar organskador (blod) genom lång eller upprepad exponering { 1:ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar: }.</p>
Skyddsangivelser	<p>P201: Inhämta särskilda instruktioner före användning.</p> <p>P202: Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.</p> <p>P260: Inandas inte damm.</p> <p>P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.</p> <p>P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.</p> <p>P280: Använd skyddshandskar.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.</p> <p>P405: Förvaras inlåst.</p> <p>P501: behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. {1::}</p>

Kapitel 4. GODKÄND ANVÄNDNING

4.1. Användningsbeskrivning

Tabell 1. Möss och/eller råttor – specialutbildade yrkesmässiga användare – inomhus

Produkttyp	PT14: Rodenticider
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Inte relevant för rodenticider
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Rattus norvegicus Svenskt namn: övrigt: Brunråtta Utvecklingsstadium: övrigt: Vuxna och juvenila Vetenskapligt namn: Mus musculus Svenskt namn: övrigt: Möss Utvecklingsstadium: övrigt: Vuxna och juvenila
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Inomhus
Appliceringsmetod(er)	Metod: Applicering av bete Detaljerad beskrivning: Endast för användning i åverkanssäkra betesstationer, förutom om användningen är begränsad till inomhus- eller utomhusområden som inte är tillgängliga för allmänheten eller icke-målorganismer (t ex industrianläggningar och infrastrukturer såsom transformationsstationer eller liknande).
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Brunråtta kraftigt angrepp: 60-100g bete per betespunkt. Mindre angrepp: 60-100g bete per betespunkt. Möss kraftigt angrepp: 20-30g bete per betespunkt. Mindre angrepp: 20-30g bete per betespunkt. Spädning (%): 0 Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Brunråtta Kraftigt angrepp: 60-100g bete per betespunkt Mindre angrepp: 60-100g bete per betespunkt Möss Kraftigt angrepp: 20-30g bete per betespunkt Mindre angrepp: 20-30g bete per betespunkt -permanent betning- Brunråtta Kraftigt angrepp: 60-100g bete per betespunkt Mindre angrepp: 60-100g bete per betespunkt. Möss

	Kraftigt angrepp: 20-30g bete per betespunkt. Mindre angrepp: 20-30g bete per betespunkt.
Användarkategori(er)	utbildat yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>Bete insvept individuellt i papperspåse 10g</p> <p>Förpackningsmaterial: Hink, Plast (PP,PE): 10g papperspåse i förpackningar upp till 10kg.</p> <p>Kartonglåda med innerfodral i PE: 10g papperspåsar i förpackningar upp till 10kg.</p> <p>Patron (PP): 50g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g , 270g, 280g, 310g, 500g Ytterförpackning - kartong med förpackningsstorlekar upp till 5580g.</p> <p>Förfyllda betesstationer (PP,PS,PVC): 2*10g or 3*10g i kartong upp till 5kg</p>

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Avlägsna rester av produkten vid behandlingstidens slut.

– Följ alla ytterligare anvisningar som ges i relevanta riktlinjer för god praxis.

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

4.1.3. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Där så är möjligt, informera berörd allmänhet före behandlingen (t.ex. de som använder den behandlade platsen och dess omgivning) om gnagarbekämpningen.

- Överväg förebyggande åtgärder (täpp igen hål, avlägsna potentiella livsmedel och drycker så långt möjligt) för att förbättra produktintaget och minska risken för nya angrepp.

– För att minska risken för sekundär förgiftning, sök efter och avlägsna döda gnagare regelbundet under behandlingen, i linje med rekommendationerna i relevanta riktlinjer för god praxis.

– Använd inte produkten vid pulsbehandlingar.

4.1.4. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

– Vid placering av betesstationer nära vattendräningsystem, se till att kontakt mellan betet och vattnet undviks.

4.1.5. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

/

4.1.6. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

/

4.2. Användningsbeskrivning

Tabell 2. Möss och/eller råttor – utbildade yrkesmässiga användare – utomhus omkring byggnader

Produkttyp	PT14: Rodenticider
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Inte relevant för rodenticider
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: <i>Rattus norvegicus</i> Svenskt namn: övrigt: Brunråtta Utvecklingsstadium: övrigt: Vuxna och juvenila

	<p>Vetenskapligt namn: Mus musculus Svenskt namn: övrigt: Möss Utvecklingsstadium: övrigt: Vuxna och juvenila</p>
Användningsområde(n)	<p>utomhusanvändning</p> <p>Utomhus omkring byggnader</p>
Appliceringsmetod(er)	<p>Metod: Applicering av bete</p> <p>Detaljerad beskrivning: Endast för användning i åverkanssäkra betestationer, förutom om användningen är begränsad till inomhus- eller utomhusområden som inte är tillgängliga för allmänheten eller icke-målorganismer (t ex allrianläggningar och infrastrukturer såsom transformationsstationer eller liknande). Inte för applicering direkt i jordhålor. Möss För användning utomhus omkring byggnader samt för att skydda infrastruktur så som transformatorstation eller liknande. Ej för användning i parker, på öppna områden, avfallsanläggningar och deponier. Brunråtta För användning utomhus omkring byggnader, vid återvinningsplatser (sopsorteringsstationer) samt för att skydda infrastruktur så som transformatorstation eller liknande. Ej för användning i parker, på öppna områden, avfallsanläggningar och deponier. I stadsparksmiljöer och vid gångstråk som förbinder stadsparken med andra högt frekventerade platser i stadsmiljön, där andra metoder och medel mot råttor inte haft tillfredställande effekt, är dock viss användning godkänd.</p>
Dosering(ar) och frekvens	<p>Dosering: Brunråtta kraftigt angrepp: 60-100g bete per betespunkt. Mindre angrepp: 60-100g bete per betespunkt. Möss kraftigt angrepp: 20-30g bete per betespunkt. Mindre angrepp: 20-30g bete per betespunkt.</p> <p>Spädning (%): 0</p> <p>Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Brunråtta Kraftigt angrepp: 60-100g bete per betespunkt. Mindre angrepp: 60-100g bete per betespunkt.</p> <p>Möss Kraftigt angrepp: 20-30g bete per betespunkt. Mindre angrepp: 20-30g bete per betespunkt.</p> <p>-permanent betning- Brunråtta Kraftigt angrepp: 60-100g bete per betespunkt Mindre angrepp: 60-100g bete per betespunkt.</p> <p>Möss Kraftigt angrepp: 20-30g bete per betespunkt. Mindre angrepp: 20-30g bete per betespunkt.</p>

Användarkategori(er)	utbildat yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>Bete insvept individuellt i papperspåse 10g</p> <p>Förpackningsmaterial: Hink, Plast (PP,PE): 10g papperspåsar i förpackning upp till 10kg.</p> <p>Kartonglåda med innerfodral i PE: 10 g papperspåsar i förpackning upp till 10kg.</p> <p>Patron (PP): 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g , 270g, 280g, 310g, 500g Ytterförpackning - kartong med förpackningsstorlekar upp till 5580g.</p> <p>Förfyllda betesstationer (PP,PS,PVC): 2*10g or 3*10g i kartong upp till 5kg.</p>

4.2.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

- Skydda betet mot vädermässiga faktorer. Placera betespunkterna på platser som inte riskerar att översvämmas.
- Ersätt allt bete i en betespunkt där betet har skadats av vatten eller förorenats av smuts.
 - Avlägsna rester av produkten vid behandlingstidens slut.
 - Följ alla ytterligare anvisningar som ges i relevanta riktlinjer för god praxis.

4.2.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

4.2.3. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- Där så är möjligt, informera berörd allmänhet före behandlingen (t.ex. de som använder den behandlade platsen och dess omgivning) om gnagarbekämpningen.
- Överväg förebyggande åtgärder (täpp igen hål, avlägsna potentiella livsmedel och drycker så långt möjligt) för att förbättra produktintaget och minska risken för nya angrepp.
- För att minska risken för sekundär förgiftning, sök efter och avlägsna döda gnagare regelbundet under behandlingen, i linje med rekommendationerna i relevanta riktlinjer för god praxis.
- Använd inte produkten vid pulsbehandlingar.

- Applicera inte denna produkt direkt in i jordhålor.

4.2.4. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Vid placering av betespunkter nära ytvatten (t.ex. åar, dammar, vattenkanaler, fördämningar, bevattningsdiken) eller vattendränningssystem, se till att kontakt mellan betet och vatten undviks.

4.2.5. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

/

4.2.6. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

/

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER¹

5.1. Bruksanvisning

- Läs och följ produktinformationen liksom all information som följer med produkten eller som tillhandahålls vid försäljningstillfället innan produkten används.
 - Genomför en förbetsundersökning av det angripna området och en bedömning på plats för att identifiera gnagararten, dess aktivitetsplatser och avgör den troliga orsaken till angreppet och dess omfattning.
 - Avlägsna livsmedel som är lätta att nå för gnagare (t.ex. utspillt sädeskorn eller livsmedelsavfall). Bortsett från detta, undvik att städa det angripna området direkt inför behandlingen, då detta bara stör gnagarpopulationen och gör det svårare att få dem att acceptera betet.
 - Produkten får bara användas som del av ett integrerat bekämpningssystem (IPM-system), inbegripet bland annat hygienåtgärder och, där så är möjligt, fysiska metoder.
 - Produkten ska placeras i omedelbar närhet av platser där gnagaraktivitet tidigare har noterats (t.ex. gångstigar, boplatser, uppfödningplatser, hål, jordhål osv.).
 - Där så är möjligt måste betesstationerna fästas i marken eller i andra objekt.
 - Betesstationer måste vara tydligt uppmärkta för att visa att de innehåller rodenticider och att de inte får flyttas eller öppnas (se avsnitt 5.3 avseende den information som ska visas på etiketten).
 - När produkten används på offentliga platser ska platserna märkas under behandlingstiden och ett meddelande sättas upp intill betet som förklarar risken för primär eller sekundär förgiftning av det antikoagulerande medlet och som anger de första åtgärderna att vidta vid förgiftning.
 - Betet ska säkras så att det inte kan dras bort från betesstationen.
 - Placera produkten oåtkomligt för barn, fåglar, sällskapsdjur, livsmedelsproducerande djur och andra icke-måldjur.
 - Placera produkten åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder, samt från föremål eller ytor som kommer i kontakt med dessa.
- Bär kemiskt beständiga skyddshandskar när produkten hanteras (handskarnas material ska anges av innehavaren av godkännandet i produktinformationen)
- Undvik att äta, dricka och röka när du använder produkten. Tvätta händerna och direktexponerad hud efter användning av produkten.
 - Hur ofta den behandlade platsen besöks ska bestämmas av saneringsteknikern mot bakgrund av undersökningen som utfördes vid behandlingens inledning. Frekvensen bör överensstämma med de rekommendationer som ges i relevanta riktlinjer för god praxis.
 - Vid liten åtgång av bete jämfört med angreppets synbara storlek, överväg att flytta betesstationerna till andra platser och att eventuellt byta till en annan betesformulering.
 - Om beten fortsätter att förtäras efter 35 dagars behandling och ingen nedgång ses i gnagaraktiviteten måste den troliga orsaken bestämmas. Om andra orsaker har uteslutits är det troligt att det finns resistent gnagare. Överväg i så fall att använda en icke-antikoagulerande rodenticid, om detta finns, eller en starkare antikoagulerande rodenticid.
- Överväg även att använda fällor som en alternativ åtgärd.

Bruksanvisning som är ”betesspecifik”:

- Bete i dospåsar: För ej tömningsbara påsar – öppna inte påsarna som innehåller betet.
- Lösa pellet-granulat, sädeskorn: Placera betet i betesstationen med ett doseringshjälpmedel. Ange metoderna för att minimera damm (t.ex. våttorkning).

För permanent betningsbehandling gäller även:

- Där så är möjligt rekommenderas det att den behandlade platsen besöks minst var fjärde vecka för att undvika utveckling av resistent populationer.
- Permanent betningsbehandling är strikt begränsad till platser med hög potential för nya angrepp när andra metoder har visat sig otillräckliga.
- Den permanenta betningsstrategin skall regelbundet ses över inom ramen för integrerade bekämpningssystem (IPM) och bedömningen av risken för nytt angrepp.

¹Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

- Där så är möjligt, informera berörd allmänhet före behandlingen (t.ex. de som använder den behandlade platsen och dess omgivning) om gnagarbekämpningen.
 - I produktinformationen (dvs. märkning och/eller broschyr) ska det finnas en tydlig angivelse om att produkten endast får tillhandahållas utbildad personal som innehar intyg på att de uppfyller utbildningskraven (t.ex. ”endast för specialutbildade yrkesmässiga användare”).
 - Använd inte produkten i områden där resistens mot det verksamma ämnet kan misstänkas.
 - Produkterna får inte användas längre tid än 35 dagar utan att angreppets omfattning och behandlingens effekt utvärderas.
 - Varva inte användning av olika antikoagulerande medel med jämförbar eller svagare styrka för att undvika resistensutveckling.
- För varvad användning, överväg att använda en rodenticid utan antikoagulerande effekt, om sådan finns, eller en kraftfullare antikoagulant.
- Rengör inte betesstationer eller verktyg som används i täckta eller skyddade betespunkter med vatten mellan applikationerna.
 - Gör dig av med döda gnagare i enlighet med lokala regler.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

- Denna produkt innehåller ett antikoagulerande ämne. Vid förtäring kan symtom som näsblod och blödande tandkött uppstå, ibland med fördröjning. I allvarliga fall kan blåmärken och blod i avföringen eller urinen förekomma.

Motgift: Vitamin K1 administrerad enbart av medicinsk/veterinärmedicinsk personal.

- Vid fall av:

- Hudexponering: tvätta huden med vatten och därefter med tvål och vatten.

- Ögonexponering: skölj ögonen med ögonsköljvätska eller vatten, håll ögonlocken öppna i minst 10 minuter.

- Oral exponering: skölj munnen noga med vatten. Ge aldrig en medvetlös person något genom munnen. Framkalla inte kräkning.

Vid förtäring, kontakta genast läkare och visa upp produktens förpackning eller etiketten.

Kontakta veterinär om ett sällskapsdjur får i sig produkten.

Betesstationer måste märkas med följande information: ”får inte flyttas eller öppnas”; ”innehåller en rodenticid”; ”produktnamn eller registreringsnummer”; ”verksamt ämne eller verksamma ämnen” och ”vid olycksfall, kontakta giftinformationscentralen”.

– Farligt för miljön och djurlivet.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

– Vid avslutad behandling ska överblivet bete och förpackningen kastas i enlighet med lokala föreskrifter

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

– Förvaras på en torr, sval och välventilerad plats. Förvara förpackningen stängd och skyddad från direkt solljus.

– Förvaras oåtkomligt för barn, fåglar, sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur.

– Hållbarhet: 24 månader

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

- På grund av att antikoagulerande rodenticider har en fördröjd verkningsmekanism tar det 4–10 dagar efter det att betet konsumerats innan det har effekt.
- Gnagare kan vara sjukdomsbärare. Vidrör inte döda gnagare med bara händer, utan använd handskar eller verktyg såsom tänger när du bortskaffar dem.
- Denna produkt innehåller ett bitterämne och ett färgämne.