

Bruksanvisning för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för:

Mospilan SG, reg.nr. 5948

Denna bruksanvisning som gäller för UPMA ska läsas tillsammans med produktens ordinarie etikett och bruksanvisning. Där finns viktig information som också gäller vid användning enligt ett UPMA.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

När en produkt används enligt ett UPMA ansvarar användaren själv för produktens effektivitet och för fytotoxiska skador som kan uppstå på grödan.

Användningsområde och anvisningar om användning

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Användning för bekämpning av insektsangrepp i yrkesmässig odling av huvudkål på friland• Max 1 behandling per år• Maximal dos vid varje behandling 325 gram per hektar• Behandlingstidpunkt – Kålhuvudet börjar bildas till skördeklar planta (BBCH 40–50)• Karenstid – 14 dagar• Rekommenderad vattenmängd – 500 liter per hektar.• Sprututrustning - bomspruta |
| <ul style="list-style-type: none">• Användning för bekämpning av insektsangrepp i yrkesmässig odling av blomkål och broccoli på friland• Max 1 behandling per år• Maximal dos vid varje behandling 325 gram per hektar• Behandlingstidpunkt – 10% av delen som ska sköras har bildats till 60% av den skördeklara delen har bildats (BBCH 41–46)• Karenstid – 7 dagar• Rekommenderad vattenmängd – 400–1000 liter per hektar.• Sprututrustning - bomspruta |
| <ul style="list-style-type: none">• Användning för bekämpning av insektsangrepp i yrkesmässig odling av brysselkål på friland• Max 1 behandling per år• Maximal dos vid varje behandling 325 gram per hektar• Behandlingstidpunkt – knopparna börjar bildas till 70% av knopparna har knutits (BBCH 41–47)• Karenstid – 14 dagar• Rekommenderad vattenmängd – 400–700 liter per hektar.• Sprututrustning - bomspruta |

• Användning för bekämpning av insektsangrepp i yrkesmässig odling av julgranar, skogsplantskoleväxter och plantskoleväxter på friland • Max 1 behandling per år Maximal dos vid varje behandling 250 gram per hektar • Behandlingstidpunkt – Plantorna mindre än 50 cm höga, maj - augusti • Rekommenderad vattenmängd – 200–1500 liter per hektar. • Sprututrustning – Nedåtriktad, handhållen spruta
• Användning för bekämpning av insektsangrepp i yrkesmässig odling av gurka i växthus • Max 3 behandlingar per år • Maximal dos vid varje behandling 500 gram per hektar • Karenstid – 3 dagar • Rekommenderad vattenmängd -200-1700 liter per hektar. Produkten kan ha negativa effekter på pollinerande insekter och biologisk bekämpning med nyttodjur.
• Användning för bekämpning av insektsangrepp i yrkesmässig odling av jordgubbar på friland, i tunnel och i växthus • Max 1 behandling per år • Maximal dos vid varje behandling 250 gram per hektar • Behandlingstidpunkt – Utlöpare börjar bildas till jordgubbarna börjar få sin sorttypiska färg (BBCH 41–85) • Karenstid – 3 dagar • Rekommenderad vattenmängd – 500–1000 liter per hektar. • Sprututrustning – Sprutning Produkten kan ha negativa effekter på pollinerande insekter och biologisk bekämpning med nyttodjur.
• Användning för bekämpning av insektsangrepp i yrkesmässig odling av hallon i tunnel. • Max 1 behandling per år • Maximal dos vid varje behandling 250 gram per hektar • Behandlingstidpunkt – avslutad längdtillväxt tills de första bären har fått sin sorttypiska färg (BBCH 39–89) • Karenstid – 3 dagar • Rekommenderad vattenmängd – 500–1000 liter per hektar. • Sprututrustning – Sprutning Produkten kan ha negativa effekter på pollinerande insekter och biologisk bekämpning med nyttodjur.

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar, skyddskläder samt ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker

Vid arbete med behandlade växtdelar

Personer som arbetar med behandlade växtdelar ska informeras om produktens hälsorisker.

Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.

Vid återinträde i behandlade områden

Efter behandling av trädplantor ska arbetskläder, (som täcker armar, ben och bål), användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 9 dyggen.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.

Spridningsutrustning handhållen spruta (julgranar, skogsplantskoleväxter och plantskoleväxter på friland, jordgubbar och hallon)

Vid användning av handhållen spruta i fält samt i tunnel med upprullade sidor:

Vid spridning ska munstycket riktas nedåt och utrustning som reducerar avdriften med minst 50% ska användas.

Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet

Spridningsutrustning bomspruta (huvudkål, blomkål, broccoli, brysselkål, jordgubbar och hallon)

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta i fält samt i tunnel med upprullade sidor

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom.”

Skyddsavstånden ska alltid avläsas i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.

Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.

Vid spridning med bomspruta i fält i odlingar av jordgubbar samt i tunnel med upprullade sidor i odlingar av hallon och jordgubbar

Vid spridning närmare än 100 meter från omgivande miljö, ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas.

Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.

Spridningsutrustning fläktspruta

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta i odlingar av hallon i tunnel med upprullade sidor

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling.”

Skyddsavståndet ska alltid avläsas i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.

Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet samt vattenlevande organismer.

Spridningsutrustning vid användning med fläktspruta

Vid spridning närmare än 100 m från vatten eller omgivande miljö ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75% användas.

Skyddsavståndet i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för 0% avdriftsreduktion.

Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.

Utformning av växthus

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Omfattar inte tunnelodling.

Utformning av tunnelodling

Tunnelodling ska var täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Omfattar inte växthus.

För närmare information gällande verknings sätt, resistensrisk, optimala verkningsförhållanden, blandningar, beredning av sprutvätska, rengöring av sprututrustning, hantering av tomemballage samt förvaring av medel hänvisas till produktens etikett och bruksanvisning.

För informationen i denna bilaga ansvarar LRF