

## Villkor för användning av Raptol Insekt Effekt Färdigblandad

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Äpple, päron		Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	150 mL/m <sup>2</sup>	7,50 mg pyretriner/m <sup>2</sup> 1238 mg rapsolja/m <sup>2</sup>	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Körsbär, plommon		Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	122,5 mL/m <sup>2</sup>	6,13 mg pyretriner/m <sup>2</sup> 1011 mg rapsolja/m <sup>2</sup>	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Vinbär, krusbär och blåbär		Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	100 mL/m <sup>2</sup>	5 mg pyretriner/m <sup>2</sup> 825 mg rapsolja/m <sup>2</sup>	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Sallat, spenat, portlak, persilja, örter, morot, rödbeta, rotpersilja, palsternacka, rädisa, svartrot, cikoria, kålrot och pepparrot	Fält	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	5	3	60 mL/m <sup>2</sup>	3 mg pyretriner/m <sup>2</sup> 495 mg rapsolja/m <sup>2</sup>	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Sallat, spenat, portlak, persilja och örter	Växthus	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	5	7	60 mL/m <sup>2</sup>	3 mg pyretriner/m <sup>2</sup> 495 mg rapsolja/m <sup>2</sup>	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Tomat och aubergine		Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	5	3	120 mL/m <sup>2</sup>	6 mg pyretriner/m <sup>2</sup> 990 mg rapsolja/m <sup>2</sup>	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Prydnadsväxter	Fält	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Växter under 50 cm	2 per år	7		60 mL/m <sup>2</sup>	3 mg pyretriner/m <sup>2</sup> 495 mg rapsolja/m <sup>2</sup>	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Prydnadsväxter	Fält	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Växter över 50 cm	2 per år	7		120 mL/m <sup>2</sup>	6 mg pyretriner/m <sup>2</sup> 990 mg rapsolja/m <sup>2</sup>	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Prydnadsväxter	Växthus	Mot insekts- angrepp	Sprutning		4 per år	7		120 mL/m <sup>2</sup>	6 mg pyretriner/m <sup>2</sup> 990 mg rapsolja/m <sup>2</sup>	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Åtgärder för skydd av miljö	Den som sprider växtskyddsmedlet utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Vid spridning	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.	Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.		
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.		