

Villkor för användning av Flurostar XL

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårvete, vårrågvete, vårråg, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13–19	1 per år			0,36 L/ha	36 g fluroxipyr/ha 0,9 g florasulam/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Vårvete, vårrågvete, vårråg, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–29	1 per år			0,8 L/ha	80 g fluroxipyr/ha 2,0 g florasulam/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Vårvete, vårrågvete, vårråg, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30–45	1 per år			1,0 L/ha	100 g fluroxipyr/ha 2,5 g florasulam/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Höstvete, rågvete, råg och höstkorn		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–29 Endast vår- behandling	1 per år			1,0 L/ha	100 g fluroxipyr /ha 2,5 g florasulam/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, rågvete, råg och höstkorn		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30–45 Endast vår- behandling	1 per år			1,2 L/ha	120 g fluroxipyr/ha 3,0 g florasulam/ha	Användningen är en behandlings- strategi Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Påfyllningsutrustning vid användning av bomspruta	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att förhindra stänk som kan orsaka ögonskador	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	