

## Villkor för användning av Conserve - Dispens under perioden 2024-08-27 till 2024-09-30

### Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden
								Produkt	Verksamt ämne	
Ekologisk odling av späda bladgrön saker (baby-leaf)	Fält	Mot kålmal och gammafly	Bomspruta	BBCH 10-18	3 per år	7	3	0,8 L/ha	96 g spinosad/ha	Dispensen får bara användas om Turex WP inte finns tillgänglig eller om Raptol redan använts två gånger under året.
Ekologisk odling av sallat	Fält	Mot gammafly	Bomspruta	BBCH 10-49	3 per år	7	3	0,8 L/ha	96 g spinosad/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 2,4 L Conserve per hektar och år och gröda. Dispensen får bara användas om Turex WP inte finns tillgänglig eller om Raptol redan använts två gånger under året.
Ekologisk odling av ruccola	Fält	Mot kålmal och gammafly	Bomspruta	BBCH 10-49	3 per år	7	3	0,8 L/ha	96 g spinosad/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 2,4 L Conserve per hektar och år och gröda. Dispensen får bara användas om Turex WP inte finns tillgänglig.

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.  Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.
Vid återinträde och arbete med behandlad sallat, ruccola och baby leaf i fält.	Vid arbete med behandlade växtdelar och återinträde i fält ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) och handskar användas under de första 10 dygna. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 36 dygn.  Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.
Vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.  Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas.  När avdriftsreducerande utrustning krävs ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.
Vid spridning	För att skydda bin och andra pollinerande insekter får växtskyddsmedlet inte spridas där det i genomsnitt finns fler än fem plantor per kvadratmeter som har utslagna blommor.	Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter samt insekter utanför fältet.
Tillblandning av sprutvätska	Vid spridning ska koncentrationen på brukslösningen vara 32-48 mg Spinosad/L brukslösning dvs vattenmängden vid spridning ska vara 200-300 L per hektar.	Villkoret är till för att brukslösningen ska ha god effekt vid spridning.