

Villkor för användning av Ariane S

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vårvede, vårkorn, vårhavre och vårråg		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 21–31	1 per år			2,5 L/ha	500 g MCPA/ha 100 g fluroxipyr/ha 50 g klopyralid/ha		
Höstvede, höstkorn, hösthavre höstråg och höstrågvete med eller utan insådd		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 21–29 Endast vår- behandling	1 gång vartannat år			2 L/ha	400 g MCPA/ha 80 g fluroxipyr/ha 40 g klopyralid/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Höstvede, höstkorn, hösthavre höstråg och höstrågvete med eller utan insådd		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 30–31 Endast vår- behandling	1 per år			3 L/ha	600 g MCPA/ha 120 g fluroxipyr/ha 60 g klopyralid/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Utsädesproduktion av gräsfrö, betesvallar, gräsmattor och gräsmatteodlingar		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 21–31 Endast vår- behandling	1 per år		30	2,5 L/ha	500 g MCPA/ha 100 g fluroxipyr/ha 50 g klopyralid/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Anpassade skyddsavstånd	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom" För användning i höststråsäd ska skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fält.	X
Hantering av växtmaterial från behandlad gröda	Halm och grovfoder från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halm och grovfoder från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm eller grovfoder får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning.	Produkten innehåller klopyralid är persistent och kan finnas kvar i restmaterial och kan skada känsliga grödor.	
Hantering av växtmaterial från behandlad gröda	Växtmaterial från en behandlad gröda får inte transporteras från det egna jordbruket för kompostering eller biogasproduktion. Växtmaterial från en behandlad gröda får inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmaterial för växter.	Produkten innehåller klopyralid är persistent och kan finnas kvar i restmaterial och kan skada känsliga grödor.	
Skydd för efterföljande grödor	Produkten innehåller verksamma ämnen som kan skada efterföljande grödor om odling sker tidigare än följande tid efter behandling med produkten: - 30 dagar för omsådd med stråsäd, majs och gräs - 12 månader: potatis, tomater, morötter andra flockblommiga växter, baljväxter, sallat och kål.	Produkten innehåller klopyralid som kan skada efterföljande grödor.	
Skydd för efterföljande grödor	Produkten innehåller klopyralid som kan överföras till efterföljande grödor och riskerar leda till överskridande av gränsvärden om odling sker tidigare än följande tid efter behandling av produkten: -90 dagar för rädisa och blast från rädisa.	Risk för överskridande av gränsvärde för resthalter av klopyralid.	