

Villkor för användning av Eledura

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

| Gröda/ situation | Var/ område | Syfte | Behandlings utrustning/ metod | Utvecklings- stadium/ tidpunkt | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring |
|---|----------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Höstvete, höstkorn, höstråg, rågvete | | Mot ogräs | Bomspruta | BBCH 10-14 Endast höst- behandling | 1 per år | | | 3 L/ha | 2000 g prosulfokarb/ha 42 g diflufenikan/ha 4 g halauxifen-metyl/ha | | |

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring |
|--------------------------------------|--|---|---------|
| Personlig skyddsutrustning | Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. | |
| Påfyllningsutrustning | Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att förhindra stänk som kan orsaka ögonskador. | |
| Vid återinträde i behandlade områden | Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 70 dagar efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. | X |
| Vid spridning | Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion. Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning. Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas. Körhastigheten får vara max 8 km/h. Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan. | Villkoret är till för att skydda människors hälsa, kommersiella odlingar som ska skördas samma höst, växter utanför fältet samt vattenlevande organismer. | |