

Villkor för användning av Taegro

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vinodling	Fält	Mot gråmögel och mjöldagg	Sprutning		10 per år	7	4 timmar	370 g/ha	3.7x10 ¹² cfu <i>B. amylolique-faciens</i> FZB24/ha	Produkten ska användas i förebyggande syfte. Produkten har inte full effekt mot mjöldagg.	
Frukt-grönsaker	Växthus	Mot svampangrepp	Sprutning		12 per år	3	4 timmar	370 g/ha	3.7x10 ¹² cfu <i>B. amylolique-faciens</i> FZB24/ha	Produkten ska användas i förebyggande syfte.	
Jordgubbar	Växthus	Mot gråmögel	Sprutning		12 per år	3	4 timmar	370 g/ha	3.7x10 ¹² cfu <i>B. amylolique-faciens</i> FZB24/ha	Produkten ska användas i förebyggande syfte.	
Sallat	Växthus	Mot sallatsbladmög el	Sprutning		12 per år	3	4 timmar	370 g/ha	3.7x10 ¹² cfu <i>B. amylolique-faciens</i> FZB24/ha	Produkten ska användas i förebyggande syfte.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddskläder, skyddshandskar, och andningskydd ska användas vid hantering av produkten, samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Tillredning av brukslösning	Produkten ska skakas före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av brukslösning.	
Hantering av brukslösning	Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.	Villkoret krävs för att brukslösningen ska vara homogen under tillredning och spridning.	