

Villkor för användning av Medax Max

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete och höstrågvete		För stråförkortning	Bomspruta	BBCH 29–49	2 per år	7		0,75 kg/ha	37,5 g prohexadion/ha 56,3 g trinexapak/ha	Maxdosen per odlingssäsong får inte överstiga 1,0 kg produkt/ha. Mellan BBCH 39–49 får maxdosen inte uppgå till mer än 0,5 kg produkt/ha.	
Höstkorn och höstråg		För stråförkortning	Bomspruta	BBCH 29–49	2 per år	7		1,0 kg/ha	50 g prohexadion/ha 75 g trinexapak/ha	Maxdosen per odlingssäsong får inte överstiga 1,0 kg produkt/ha. Mellan BBCH 39–49 får maxdosen inte överstiga 0,75 kg produkt/ha.	
Hösthavre		För stråförkortning	Bomspruta	BBCH 29–39	1 per år			0,75 kg/ha	37,5 g prohexadion/ha 56,3 g trinexapak/ha		
Vårkorn och vårvete		För stråförkortning	Bomspruta	BBCH 29–39	2 per år	7		0,5 kg/ha	25 g prohexadion/ha 37,5 g trinexapak/ha	Maxdosen per odlingssäsong får inte överstiga 0,5 kg produkt/ha.	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
										För behandling i vårve. Mellan BBCH 35–39 får maxdoxen inte överstiga 0,3 kg produkt/ha.	
Vårhavre		För strå- förtörning	Bomspruta	BBCH 29–34	1 per år			0,5 kg/ha	25 g prohexadion/ha 37,5 g trinexapak/ha		
Rajgräsfrö till utsäde		För strå- förtörning	Bomspruta	BBCH 29–49	1 per år			1,0 kg/ha	50 g prohexadion/ha 75 g trinexapak/ha	Grödan får inte användas till foder. Totala maximala dosen per odlings- säsong får inte överstiga 1,0 kg produkt/ha.	
Gräsfrö till utsäde		För strå- förtörning	Bomspruta	BBCH 29–39	1 per år			1,0 kg/ha	50 g prohexadion/ha 75 g trinexapak/ha	Grödan får inte användas till foder.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	