

Villkor för användning av Roxy XL

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 00-09	1 gång per år			3,5 L/ha	3,15 kg prosulfokarb /ha	Varje användning representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 10-21 September till oktober	1 gång per år			3,35 L/ha	3,02 kg prosulfokarb /ha	Varje användning representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Potatis	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 00-09	1 gång per år			3,5 L/ha	3,15 kg prosulfokarb /ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Hantering av brukslösning	Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning	Villkoret krävs för att brukslösningen ska vara homogen under tillredning och spridning.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid återinträde i behandlade områden	Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 55 dygna efter behandling.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.		
Vid spridning på hösten i höstvet, höstkorn, höstråg och höstrågvete	<p>Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.</p> <p>Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.</p> <p>Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.</p> <p>Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.</p> <p>Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas.</p> <p>Körhastigheten får vara max 8 km/h.</p> <p>Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.</p>	Villkoret är till för att skydda kommersiella odlingar som ska skördas samma höst, människor i närområdet, vattenlevande organismer och växter utanför fältet	
Vid spridning på våren i potatis	<p>Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas.</p> <p>Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet</p>	Villkoret är till för att skydda kommersiella odlingar, skydda människor i närområdet, vattenlevande organismer och växter utanför fältet	