

Villkor för användning av Tripali

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstråg och höstrågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 23–39	1 per år			50 g/ha	4,05 g metsulfuronmetyl/ha 4,0 g tribenuronmetyl/ha 5,25 g florasulam/ha		
Höstkorn		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 23–30	1 per år			50 g/ha	4,05 g metsulfuronmetyl/ha 4,0 g tribenuronmetyl/ha 5,25 g florasulam/ha		
Vårvete, vårråg, vårrågvete och vårkorn		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13–39	1 per år			50 g/ha	4,05 g metsulfuronmetyl/ha 4,0 g tribenuronmetyl/ha 5,25 g florasulam/ha		
Vårhavre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13–30	1 per år			25 g/ha	2,03 g metsulfuronmetyl/ha 2,0 g tribenuronmetyl/ha 2,63 g florasulam/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	