

## Bruksanvisning för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för:

### Lentagran WP, reg.nr 5818

Denna bruksanvisning som gäller för UPMA ska läsas tillsammans med produktens ordinarie etikett och bruksanvisning. Där finns viktig information som också gäller vid användning enligt ett UPMA.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

När en produkt används enligt ett UPMA ansvarar användaren själv för produktens effektivitet och för fytotoxiska skador som kan uppstå på grödan.

#### Användningsområde:

Mot örtogräs i morötter på friland  
Mot örtogräs i linser på friland  
Mot örtogräs i kikärtor på friland  
Mot örtogräs i lupiner på friland

#### Anvisningar om användning:

##### Morötter på friland

Behandling får utföras när morötterna är i BBCH 12–16 (2 till 6 örtblad) med max 2 behandlingar per år och med minst 7 dagars intervall. Max dos vid varje behandlingstillfälle är 0,5 kg per hektar. Vattenmängden ska vara 200–400 liter per hektar.

Det är viktigt att utföra behandlingen då morotsbladen är torra.

##### Linser på friland

Linser kan behandlas enligt två olika alternativ:

1. BBCH 13–16 (linserna har 3–6 örtblad). Max 0,5 kg per hektar får användas vid 2 behandlingstillfällen per år. Behandlingsintervallet ska vara minst 7 dagar.
2. BBCH 13–16 (linserna har 3–6 örtblad). Max 1 kg per hektar får användas vid 1 behandlingstillfälle per år.

Dessa två strategier får inte kombineras. Totala maximala dosen får inte överskrida 1 kg produkt per hektar och år. Vattenmängden ska vara 200–400 liter per hektar.

Vid bekämpningstillfället är det viktigt att kontrollera att linsplantorna nått utvecklingsstadiet BBCH 13 (3 örtblad) för att minska risken för skada.

##### Kikärtor på friland

Kikärtor kan behandlas enligt två olika alternativ:

1. BBCH 11–16 (kikärtorna har 1–6 örtblad). Max 0,5 kg per hektar får användas vid 2 behandlingstillfällen per år. Behandlingsintervallet ska vara minst 7 dagar. Vid delad behandling rekommenderas första behandlingen när kikärtorna är i BBCH 12–14 (2–4 örtblad) och den uppföljande behandlingen i BBCH 15–16 (5–6 örtblad).

2. BBCH 13–16 (kikärterna har 3–6 örtblad). Max 1 kg per hektar får användas vid 1 behandlingstillfälle per år.

Dessa två strategier får inte kombineras. Totala maximala dosen får inte överskrida 1 kg produkt per hektar och år. Vattenmängden ska vara 200–400 liter per hektar.

### **Lupiner**

Lupiner kan behandlas enligt två olika alternativ:

1. BBCH 13–16 (lupinerna har 3–6 örtblad). Max 0,5 kg per hektar får användas vid 2 behandlingstillfällen per år. Behandlingsintervallet ska vara minst 7 dagar.
2. BBCH 13–16 (3–6 örtblad). Max 1 kg per hektar får användas vid 1 behandlingstillfälle per år.

Dessa två strategier får inte kombineras. Totala maximala dosen får inte överskrida 1 kg produkt per hektar och år. Vattenmängden ska vara 200–400 liter per hektar.

Vit lupin är känsligare för behandlingar med Lentagran WP än blå och gul lupin. Det är viktigt att kontrollera att lupinerna har nått BBCH 13 (3 örtblad) vid bekämpningstillfället för att undvika skada.

### **Generellt gällande för alla grödor**

Det är viktigt att utföra behandling på grödor som är i god tillväxt och som har utvecklat ett skyddande vaxskikt.

Behandling ska ske på torra blad hos grödan.

Höga temperaturer, över 25°C vid behandlingstillfället ökar risken för skada. Vid perioder med kallt och regnigt väder samt vid låga temperaturer under 2°C ökar risken för brännskador.

**Ytterligare villkor:**

**Personlig skyddsutrustning:** Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

**Vid återinträde i behandlade områden:** Skyddshandskar ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 2 dyggen efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Villkoren är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.

**Anpassade skyddsavstånd vid spridning:** Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälprea vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.

För närmare information gällande verknings sätt, resistensrisk, optimala verkningsförhållanden, blandningar, beredning av sprutvätska, rengöring av sprututrustning, hantering av tomemballager samt förvaring av medel hänvisas till produktens etikett och bruksanvisning.

**För informationen i denna bilaga ansvarar Nordisk Alkali AB.**