

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Starane 180**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ / /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne ⁴	
Höstvete, höstkorn, råg och rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	12-45/ endast vår- behandling	1			0,8 L/ha	144 g/ha	X
Vårvete, vårkorn, havre	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45	1			0,7 L/ha	126 g/ha	X
Fodermajs	Mot örtogräs	Bomspruta	13-16	2	10-12		1,1 L/ha	198 g/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,1 L produkt/ha och säsong.
Gräsfrövall, slåttervall, betesvall	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45/ endast vår- behandling	1		7	2,0 L/ha	360 g/ha	X
Golfbanor	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45	1			2,0 L/ha	360 g/ha	X
Gräsmattor	Mot örtogräs	Bomspruta	30-45	1			2,0 L/ha	360 g/ha	X

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Släpp av betesdjur	Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.		X
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd användas.	Andra hälsoskydds-åtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Dosen uttryckt i verksamt ämne fluroxipyr