

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Barclay D-quat**

Användning och syfte

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlingsmetod | Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max) | Max antal behandlingar/år | Behandlingsintervall (dygn) | Karens-tid (dygn) ²⁾ | Max dos vid varje behandling | | Ändring ³⁾ |
|------------------------|-------------|------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne ⁴⁾ | |
| Potatis | Nedvissning | Bomspruta | 85-89 | 1 | | 10 | 4,0 L/ha | 0,8 kg/ha | X |

Ytterligare villkor

| | Ytterligare villkor | Anmärkning | Ändring ³⁾ |
|---|---|--|-----------------------|
| Utformning av spridningsutrustning | Produkten får inte appliceras med så kallad Ultra low volume (ULV)-utrustning | | X |
| Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med bomspruta | Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan. | Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet och vattenlevande organismer. | X |
| Personlig skyddsutrustning | Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | X |

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Dosen avser syraformen av dikvat