

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Diflanil 500 SC**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling			Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstråg, rågvete och dinkelvete	Mot örtogräs	Bomspruta	≤29	1			250 ml/ha	125 g/ha		X
Vårkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	26-29	1			125 ml/ha	62,5 g/ha		X

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3)</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]