

Villkor för användning av **Vertimec**

Användning och syfte

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Paprika och tomat i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp.	Sprutning	12-89	5	7	3	0,12 mL/m ²	2,16 mg/m ²	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Gurka och squash i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp.	Sprutning	10-89	4	7	3	0,12 mL/m ²	2,16 mg/m ²	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Melon och pumpa i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp.	Sprutning	10-89	3	7	3	0,12 mL/m ²	2,16 mg/m ²	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Sallat och örtekryddor i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp.	Sprutning	12-55	4	7	12	0,05 mL/m ²	0,9 mg/m ²	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Jordgubbar i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp.	Sprutning	12-89	3	7	3	0,12 mL/m ²	2,16 mg/m ²	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Snittblommor i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp.	Sprutning		3	7		0,12 mL/m ²	2,16 mg/m ²		X
Prydnadsväxter i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp.	Sprutning		5	5		0,12 mL/m ²	2,16 mg/m ²	Gäller inte snittblommor.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2015-05-25Diariernr
F-2423-B14-00466Aktnr
F-2423Produktnamn
VertimecReg nr
4693

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ²⁾
Åtgärder för skydd av pollinerande insekter i växthus	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.		X
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Lokalerna ska vädras omsorgsfullt efter behandling. Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Hantering av sprutvätska	Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.		
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	X