

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Danitron 5 SC**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>	
							Produkt	Verksamt ämne		
Äpple och päron	Mot kvalster	Fläktspruta	51-85	1		21	2 L	102 g	Högst 0,75 L produkt/ha och m trädhöjd	
Prydnadsväxter i växthus	Mot kvalster	Sprutning	11-89	1			2 L	102 g		
Jordgubbar i växthus	Mot kvalster	Sprutning	11-81 samt efter skörd	1		7	2 L	102 g		X
Tomat, aubergine och paprika i växthus	Mot kvalster	Sprutning	11-89	1		7	2 L	102 g		X
Slanggurka, zucchini/squash i växthus	Mot kvalster	Sprutning	11-89	1		7	2 L	102 g		X
Bönor i växthus	Mot kvalster	Sprutning	11-89	1		7	2 L	102 g		X

### Ytterligare villkor

Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med fläktspruta	Villkoren är till för att skydda vattenlevande organismer.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2015-05-27

Diariernr  
5.1.1-B14-00678

Aktnr  
F-2056

Produktnamn  
Danitron 5 SC

Produktkod

Reg nr  
4604

## Tillstånd och upplysning

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av fläktspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling". Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 99 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar, skyddskläder, skyddsglasögon och andningsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Återinträde i behandlade områden	Gå inte in i behandlade områden innan sprutvätskan torkat in.		X
Åtgärder för skydd av pollinerande insekter i växthus	Ta bort kolonier av pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.		X
Utformning av växthus	Växthus ska vara täkta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	X