

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Butisan Top** – Dispens under perioden 2015-06-29 till 2015-09-30

Användning och syfte

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar/år | Behandlings- intervall (dygn) | Karenstid (dygn) ²⁾ | Max dos vid varje behandling | |
|--|-----------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne |
| Höstoljeväxter | Mot ogräs | Bomspruta | 00-12 | 1 | | | 2,0 L/ha | 750 g/ha metazaklor 250 g/ha kvinmerak |
| Blomkål, broccoli, grönkål, salladskål, kålrot, rova, kålramb, brysselkål och huvudkål, utsädesodling av kinakål | Mot ogräs | Bomspruta | 00-05, eller 12-14, eller 8-10 dagar efter plantering | 1 | | | 2,0 L/ ha | 750 g/ha metazaklor 250 g/ha kvinmerak |
| Plantskolekulturer/friland | Mot ogräs | Avskärmat traktorspruta | | 1 | | | 2,0 l/ ha | 750 g/ha metazaklor 250 g/ha kvinmerak |

Ytterligare villkor

| | Villkor | Anmärkning |
|---|---|--|
| Åtgärder för skydd av grundvatten | Använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande metazaklor mer än vart 3:e år på samma fält. Den totala dosen under treårsperioden får högst vara 1,0 kg metazaklor/ha. | |
| Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta | Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 90 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer. |
| Åtgärder för skydd av efterföljande gröda | Ny gröda av blomkål, broccoli, grönkål, salladskål, kålrot, rova, kålramb, brysselkål och huvudkål får inte sås eller planteras tidigare än 120 dagar efter behandling med Butisan Top. | |

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2015-06-29Diariernr
5.1.2.a-H15-05592Aktnr
F-2235

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Butisan TopProduktkod
BAS 526 14HReg nr
(4634)

| | Villkor | Anmärkning |
|---------------------------------|---|---|
| Personlig skydds- utrustning | Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas till och med 7 dagar efter behandling. | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. |