

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Confidor WG70**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karestid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
Tomat och paprika i växthus	Mot insektsangrepp	Droppbevattning		1		3	35 mg/m ²	24,5 mg/m ²	x
Gurka i växthus	Mot insektsangrepp	Droppbevattning		1		3	19,6 mg/m ²	13,7 mg/m ²	x
Prydnadsväxter i växthus	Mot insektsangrepp	Droppbevattning och sprutning		2	14		45 mg/m ²	31,5 mg/m ²	x

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering och sprutning av medlet ska andningsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	x
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen. Lokalerna ska vädras ordentligt före återinträde.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	x
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	x
Vid spridning i växthus	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.	Vid spridning i växthus	x

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]