

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Gnatrol SC**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Anmärkning	Vätske- mängd
							Produkt	Verksamt ämne		
Prydnadsväxter i ekologisk odling i växthus	Mot sorgmyggor	Vattnas ut.	Samtliga.	3 per kultur	5-7	-	5-10 ml/kvm	0,6-1,2 g	Den lägsta doseringen kan användas mot mindre populationer av små larver i tidigt larvstadium och om behandlingen kombineras med andra metoder.	2 l/kvm
Kryddor och sallat i växthus	Mot sorgmyggor	Vattnas ut	Samtliga.	3 per kultur	5-7		5-10 ml/kvm	0,6-1,2 g	Den lägsta doseringen kan användas mot mindre populationer av små larver i tidigt larvstadium och om behandlingen kombineras med andra metoder. 21 dygn före skörd får utvattning endast ske genom rännor, på ebb- och flodbord eller via droppbevattning så att inget bevattningsvatten hamnar på ätliga grödor. I småplantstadiet krävs inga sådana inskränkningar.	2 l/kvm

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning
Personlig skyddsutrustning	Använd ansiktsskydd (halvmask med partikelfilter P2), skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder när du hanterar preparatet.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd