

## Bilaga 3 – Specificerade användningsvillkor för **Fibro**

### Sammanfattning av användningsområdet

Mot bladlöss i odlingar av potatis.  
Mot spindeldjur i odling av äpple, päron, plommon och körsbär.  
Mot insekter i odlingar av päron.

### Specifikation

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid <sup>1)</sup>	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring <sup>2)</sup>
							produkt/ha	verksamt ämne/ha		
Potatis	mot bladlöss	Lantbruks-spruta med bom / Hel-täckande bladsprutning	BBCH 10-89	8	7	-	10 L	7,97 kg		
Äpple, päron, plommon och körsbär	mot fruktträds-spinnkvalster ( <i>Panonychus ulmi</i> )	Fläktspruta / blad-sprutning	BBCH 53-57	1	-	-	20-30 L	15,94-23,91 kg		
Päron	mot päron-bladloppa ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	Fläktspruta / blad-sprutning	BBCH 53-57	2	2	-	20-30 L	15,94-23,91 kg	max. 40 L produkt/ha per år.	

<sup>1)</sup> Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

<sup>2)</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2014-02-03Diarienumr  
F-3966-B12-00352

Aktnr

Produktnamn  
FibroProduktkod  
BCP405DReg nr  
5174

## Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring <sup>3)</sup>
Fruktodlingar	<p>För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.</p> <p>Utrustning som reducerar vindavdriften med minst 50 % ska användas. Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.</p>	