

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Previcur Energy**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Sallat i växthus	Mot svamp- angrepp	Utvattning	1-10	2		21	3 ml/m ²	1,59 g/m ² propamokarb 0,93 g/m ² fosetyl	Behandling ska göras innan utplantering.	X
Sallat på friland och i växthus	Mot svamp- angrepp	Sprutning	12-41	2		21	2,5 l/ha	1,33 kg/ha propamokarb 0,78 kg/ha fosetyl	Behandling ska göras efter utplantering.	X
Tomat och gurka i växthus	Mot svamp- angrepp	Utvattning	1-10	2		3	3 ml/m ²	1,59 g/m ² propamokarb 0,93 g/m ² fosetyl	Behandling ska göras innan utplantering.	X
Tomat och gurka i växthus	Mot svamp- angrepp	Dropp- bevattning	12-80	4		3	0,3 ml/m ²	0,159 g/m ² propamokarb 0,093 g/m ² fosetyl	Behandling ska göras efter utplantering.	X
Småplantor av huvudkål, blomkål, broccoli och brysselkål i växthus	Mot svamp- angrepp	Utvattning	1-13	2			3 ml/m ²	1,59 g/m ² propamokarb 0,93 g/m ² fosetyl	Behandling ska göras innan utplantering.	X

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av växtskyddsmedlet eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid spridning i växthus med handhållen utrustning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]