

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Floramite 240 SC**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklingsstadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karenstid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Prydnadsväxter och plantaskolor	Mot angrepp av kvalster.	Sprutning		2			0,6 L/ha	144 g/ha	
Jordgubbar	Mot angrepp av kvalster.	Sprutning	<85	2		3	0,6 L/ha	144 g/ha	
Gurka och tomat i växthus	Mot angrepp av kvalster.	Sprutning		2		1	80 mL/ m <sup>2</sup>	19,2 g/m <sup>2</sup>	

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar, skyddskläder och andningskydd användas. Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Lokalerna ska vädras omsorgsfullt efter behandling. Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]