

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Folpan 500 SC**

### Användning och syfte

Gröda/område /situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Vete	Svartpricksjuka ( <i>Septoria tritici</i> )	Bomspruta	30-59	2	7-10	42	1,5 L/ha	750 g/ha	Behandling förväntas inte ge full effekt. Behandling måste utföras innan angreppet är omfattande om behandling ska ha effekt.
Korn	Sköldfläcksjuka ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	Bomspruta	30-59	2	7-10	42	1,5 L/ha	750 g/ha	Behandling förväntas inte ge full effekt. Behandling måste utföras innan angreppet är omfattande om behandling ska ha effekt.

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Vid spridning	En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd minst 1 år före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. Den markanpassade skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.  Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoren är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]