

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Milbeknock**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne <sup>4)</sup>	
Prydnadsväxter i växthus	Mot angrepp av insekter och kvalster	Sprutning		2	7-10		0,2 mL/m <sup>2</sup>	1,86 mg/m <sup>2</sup>	

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter	Vid behandling i växthus ska utplacerade kolonier av humlor eller andra pollinerande insekter stängas till eller tas bort innan sprutning och får återintroduceras tidigast 4 dagar efter behandlingen.		
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3)</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

<sup>4</sup> Angett som Milbemectin