

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Starane XL**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
Höstvete, höstkorn, råg och rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1			1,2 L/ha	173 g/ha fluroxipyr 3,0 g/ha florasulam	
Vårvete, vårkorn, havre	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45	1			1,0 L/ha	144 g/ha fluroxipyr 2,5 g/ha florasulam	
Gräsfrövall, slåttervall, betesvall	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1		7	1,8 L/ha	259 g/ha fluroxipyr 4,5 g/ha florasulam	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Släpp av betesdjur	Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.		
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon/ansiktsskydd användas.	Andra hälsoskydds-åtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]